

松喰い虫防除薬剤(樹幹注入・土壌灌中) 1/2

商 品 名	グリーンガード・エイト	グリーンガード・NEO	ショットワン・ツー液剤
価 格 / 荷 姿	¥104,000 / 220ml×10×4 ¥130,000 / 220ml×50	¥156,000 / 90ml×10×6 ¥130,000 / 90ml×50	¥125,000 / 60ml × 10 × 5
ア ン プ ル 単 価	¥2,600 / 220ml	¥2,600 / 90ml	¥2,500 / 60ml
成 分 名 (AI %)	酒石酸モランテル 8%	酒石酸モランテル 20%	エマメクチン安息香酸塩 2%
人 畜 毒 性	普通物	普通物	普通物
魚 毒 性 (原 体)	A類	A類	C類
魚 毒 性 (製 剤)	A類	A類	A類
残 効 期 間	6年	7年	6年
登 録 適 用	松 (生立木)	松 (生立木)	松 (生立木)
使 用 量	胸高直径(cm) / 注入量(ml)	胸高直径(cm) / 注入量(ml)	胸高直径(cm) / 注入量(ml)
	6~10 / 110	5~10 / 45	11~15 / 60
	10~15 / 220	10~15 / 90	16~20 / 60~120
	15~20 / 330	15~20 / 135	21~25 / 120~180
	20~25 / 440~660	20~25 / 180~270	26~30 / 180~240
	25~30 / 660~880	25~30 / 270~360	30cm以上は5cm増すごとに 60~120増量
	30~35 / 880~1100	30~35 / 360~450	
	35~40 / 1100~1320	35~40 / 450~540	
	40cm以上は5cm増すごとに 110~330増量	40cm以上は5cm増すごとに 45~135増量	
使 用 方 法・時 期	樹幹注入 (11月~3月上旬)	樹幹注入 (11月~3月上旬)	樹幹注入 (11月~4月初旬)
適 用 害 虫	マツノザイセンチュウ	マツノザイセンチュウ	マツノザイセンチュウ
備 考			危険物第4類第1石油類
特 徴	水に溶解易く、樹体への吸収、各部への分散に優れる	水に溶解易く、樹体への吸収、各部への分散に優れる	松への負担が少なく、長期防除が可能
薬 剤 登 録 番 号	16441	22028	20238

松喰い虫防除薬剤(樹幹注入・土壌灌中) 2/2

商 品 名	マツガード	メガトップ液剤	ネマバスター
価 格 / 荷 姿	¥200,000 / 60ml×10×8 ¥300,000 / 180ml×20×2	¥150,000 / 120ml×10×2 ¥150,000 / 80ml×10×3 ¥150,000 / 40ml×10×6	¥56,000 / 1L × 4
ア ン プ ル 単 価	¥2,500 / 60ml	¥7,500 / 120ml ¥2,500 / 40ml ¥5,000 / 80ml	
成 分 名 (AI %)	ミルバメクチン 2%	ネマデクチン 3.6%	ホスチアゼート30%
人 畜 毒 性	普通物	普通物	劇物
魚 毒 性 (原 体)		C類	A類
魚 毒 性 (製 剤)	B類	C類	A類相当
残 効 期 間	6年	5年	1年
登 録 適 用	松 (生立木)	松 (生立木)	松 (生立木)
使 用 量	胸高直径 (cm) / 注入量 (ml)	胸高直径 (cm) / 注入量 (ml)	胸高直径 (cm) / 注入量 (L)
	10~15 / 60	10~15 / 40	5~10 / 6
	15~20 / 60~120	15~20 / 40~80	10~15 / 8
	20~25 / 120~180	20~25 / 80~120	15~20 / 12
	25~30 / 180~240	25~30 / 120~160	20~25 / 18
	30cm以上は5cm増すごとに 60増量	30cm以上は5cm増すごとに 40増量	25~30 / 26
			30~35 / 38
			35~40 / 52
40cm以上は5cm増すごとに 18~30増量			
使 用 方 法・時 期	樹幹注入 (11月~4月初旬)	樹幹注入 (12月~3月)	土壌灌注
適 用 害 虫	マツノザイセンチュウ	マツノザイセンチュウ	マツノザイセンチュウ
備 考		危険物第4類第1石油類	危険物第4類第3石油類
特 徴	低薬量でも高い効果	マツノザイセンチュウの増殖抑制効果高く、薬液の浸透拡散性に優れ、製品重量、回収容器共に最小	浸透移行性に優れ、松を傷つけずに防除
薬 剤 登 録 番 号	20403	19325	21971